



Tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie (narcose)

Locatie Hoofddorp

Informatie voor patiënten

Onze missie

Wij bieden bijzondere tandheelkundige zorg aan patiënten die zo bijzonder zijn dat zij niet bij de gewone tandarts terecht kunnen.

Adres

Verwijspraktijk Diamantlaan
(bij de Kliniek voor Kaakchirurgie
Haarlemmermeer)
Diamantlaan 15
2132 WV Hoofddorp

Binnenkort ondergaat u een tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie. Dit wordt ook wel narcose genoemd. De anesthesioloog brengt u in een hele diepe slaap zodat u niets van de behandeling merkt. U wordt pas wakker als de behandeling voorbij is. Om de behandeling veilig te laten verlopen, is het belangrijk dat u deze folder goed leest.

Nuchterheid op de dag van de behandeling

Voor de behandeling moet de maag leeg zijn, zodat er geen maaginhoud in de longen terecht kan komen. Om dit te voorkomen moet u voor de behandeling 'nuchter' zijn. Dat betekent dat u vanaf een bepaalde tijd niet meer mag eten en drinken. Als u toch eet of drinkt voor de behandeling, kan deze niet doorgaan!

Voor de behandeling

Omdat het belangrijk is de maag leeg te hebben moet u zich strikt aan de hieronder beschreven voorschriften houden.

Niets meer eten na middernacht (24:00 uur) voorafgaand aan de dag van de behandeling. Als u 's middags (na 12:00 uur) wordt geholpen mag u tot 06:00 uur 's ochtends een licht ontbijt eten (1 boterham met jam, zonder boter), daarna niet meer.

Tot 2 uur voor de behandeling mag u nog wel wat water, thee (zonder melk) of limonade zonder prik drinken.

LET OP: Mocht u zich niet aan de voorschriften houden, dan kan de behandeling die dag mogelijk niet doorgaan en zullen kosten in rekening worden gebracht.





Als u het pand binnenloopt, gaat u rechtdoor naar de verwijspraktijk waar ook de SBT banner staat. U kunt plaatsnemen op de paars met groene bankjes.



LET OP: U hoeft zich niet aan te melden, er komt vanzelf een medewerker van SBT naar u toe.

Medicijngebruik

Uw eigen medicijnen kunt u op de dag van de behandeling gewoon innemen met een slokje water.

Premedicatie (rustgevende medicatie) is niet nodig; maar soms kan dit met de eigen huisarts of de arts van de instelling overlegd en voorgeschreven worden. De anesthesioloog heeft liever geen premedicatie in verband met de dan langere uitslaaptijden.

Belangrijk – als u antistolling gebruikt of suikerziekte hebt:

Antistolling: In overleg met uw tandarts stoppen of doorgaan. Als u moet stoppen dan kunt u samen met uw tandarts het schema gebruiken op het formulier ‘antistolling/ bloedverdunners’ dat u krijgt overhandigd. Dit is meestal afhankelijk van de behandeling en gaat zodoende ALTIJD in overleg met de hoofdbehandelaar: de tandarts.

Suikerziekte of diabetes: medicatie innemen volgens ‘Diabetes protocol’ dat u krijgt overhandigd. Verder zult u in principe als eerste worden geholpen zodat de suikerspiegel zo stabiel mogelijk is en blijft.



Kleding

Kleedt u warm aan. Tijdens de behandeling koelt u namelijk wat af, waardoor u, na het wakker worden het koud kan hebben. Neemt u voor de zekerheid ook een schoon setje ondergoed mee.

Contactlenzen

Contactlenzen moeten voor de ingreep worden uitgedaan.

Sieraden

Eventuele sieraden en tong piercings moeten, indien mogelijk, worden verwijderd. Indien er toch sieraden of piercings aanwezig zijn is dit op eigen risico.

Nagellak

Nagellak verwijderen van beide wijsvingers.

Vlak voor de behandeling

Vlak voor de behandeling worden door de anesthesioloog en de tandarts nog enkele vragen ter controle aan u gesteld. De vragen zijn bedoeld om samen met u en het hele behandelteam af te stemmen of de juiste persoon aanwezig is, om welke behandeling het gaat en of er nog bijzonderheden zijn.

Zijn er belangrijke veranderingen in de gezondheid geweest tussen het moment van het afnemen van de vragenlijst of intake en het moment van behandelen, dan moet u dit aangeven.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u wakker in de tandartsstoel. Hierna wordt u naar de uitslaapruimte gebracht. In deze periode zult u zich bewust worden van wat kleine ongemakken:

1. Omdat u tijdens de narcose wordt beademend, kunt u na de behandeling wat last hebben van keelpijn, pijn achterin de neus of wat bloederige afscheiding uit neus of mond. Dit is niet gevaarlijk en meestal binnen een dag verdwenen. U kunt ter verlichting iets kouds drinken of een waterijsje eten.
2. Soms geeft de tandarts naast de narcose ook nog een plaatselijke verdoving in de mond. Hierdoor kan de mond nog wat verdoofd aanvoelen. Deze extra verdoving wordt toegepast om de pijn te verminderen en de narcose zo 'licht' mogelijk te kunnen houden.
3. Het is mogelijk dat u na de behandeling een beetje misselijk of rillerig bent. Als u bij eerdere narcose misselijk bent geweest is het goed dat vooraf aan te geven aan de anesthesioloog.

Weer naar huis

Houdt u er rekening mee dat u na de behandeling moet worden opgehaald. U mag niet zelfstandig naar huis. Wij houden de regel aan van twee volwassen begeleiders. Gaat u met de taxi dan is één volwassen begeleider genoeg.

LET OP: U mag niet zelfstandig naar huis met openbaar vervoer. Het is belangrijk dat u zorgt dat er de rest van de middag, avond en nacht nog iemand bij u is.





Mocht u vragen hebben met betrekking tot de behandeling, dan kunt u deze via het reguliere telefoonnummer van SBT 020 792 0520 van maandag tot en met vrijdag tussen 07.45 en 16.15 uur stellen. Bij acute tandheelkundige problemen na de behandeling kunt u ook bij dit nummer terecht of buiten kantooruren bij de Mondzorgpoli, telefoonnummer 088 263 2727.

Pijnstilling na de behandeling

Tegen de pijn na de behandeling, kunt u de volgende medicijnen nemen:

Paracetamol	500mg	4 maal daags 2 tabletten	maximaal 4000 mg/dag
Ibuprofen	400 mg	3 maal daags 1 tablet	maximaal 1200 mg/dag

Begin met paracetamol. Bij onvoldoende resultaat kunt u dit aanvullen met ibuprofen (Brufen). Dus als paracetamol alleen niet voldoende is, mag u meestal zowel paracetamol als ibuprofen innemen. **Haalt u deze medicijnen van tevoren in huis.**



Experts Bijzondere Mondzorg

Zorg op maat in goede handen

Stichting Bijzondere Tandheelkunde

Hoofdlocatie

ACTA-gebouw, 2e verdieping
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam

E-mail: info@sbt.nl
Telefoon: 020 792 0520
Website: www.sbt.nl

Locatie Hoofddorp

Verwijspraktijk Diamantlaan
Diamantlaan 15
2132 WV Hoofddorp

